



BFS Aktuell

Actualités OFS

14 Gesundheit / Santé

Neuchâtel, März / mars 2007

Statistik des Schwangerschaftsabbruchs

Resultate 2005

Statistique des interruptions de grossesse

Résultats 2005

.....

Auskunft:

Dr. Marjorie Mariller, BFS, Sektion Gesundheit, Tel.: +41 32 71 36177

E-Mail: marjorie.mariller@bfs.admin.ch

Bestellnummer: 532-0707-05

Renseignements:

Dr Marjorie Mariller, OFS, Section Santé, tél.: +41 32 71 36177

e-mail: marjorie.mariller@bfs.admin.ch

N° de commande: 532-0707-05

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	5
I Einleitung	6
II Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2005 und jüngste Entwicklungen	8
III Schwangerschaftsabbrüche nach Altersklassen	9
IV Schwangerschaftswoche und Abbruchmethode	10
V Wohnsitz und Nationalität	11
VI Tabellen	12

Sommaire

Résumé	5
I Introduction	6
II Interruptions de grossesse en 2005 et évolution récente	8
III Interruptions de grossesse par groupe d'âge	9
IV Délai et méthode employée	10
V Domicile et nationalité	11
VI Tableaux	12

Zusammenfassung

Im Jahr 2005 wurden in der Schweiz 10'774 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Dies entspricht einer Rate von 7 Abbrüchen auf 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Zahl und die Rate der Schwangerschaftsabbrüche sind gegenüber den beiden vorangehenden Jahren stabil geblieben. Wie bereits 2004 betrug der Anteil der unter 16-Jährigen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen liessen, 1%, und 95% der Abbrüche wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von 12 Wochen (Art. 119, Abs. 2 StGB) vorgenommen. Rund 50% der Schwangerschaftsabbrüche wurden chirurgisch durchgeführt, die anderen 50% medikamentös (oder in Kombination).

Etwa 95% der betroffenen Frauen lebten in der Schweiz, und 88% liessen den Abbruch im Wohnkanton vornehmen. Bei etwa der Hälfte der betroffenen Frauen handelte es sich um Schweizerinnen.

Résumé

En 2005, 10774 interruptions de grossesse ont été annoncées dans notre pays. Cela correspond à un taux d'environ 7 interruptions de grossesse pour 1000 femmes de 15 à 44 ans domiciliées en Suisse. Le nombre et le taux d'interruptions restent stables par rapport aux deux années précédentes. Comme en 2004, 1% des femmes ayant procédé à une interruption de grossesse avaient moins de 16 ans et quelque 95% des interruptions ont été pratiquées dans le délai de 12 semaines prévu par l'article 119 alinéa 2 du Code pénal. Environ 50% des interruptions de grossesse ont été pratiquées par voie chirurgicale, et 50% par voie médicamenteuse (ou les deux).

Environ 95% des femmes ayant procédé à une interruption de grossesse vivaient en Suisse, et 88% ont subi l'intervention dans leur canton de domicile. La moitié environ des femmes concernées était de nationalité suisse.

I Einleitung

Die vorliegende Publikation präsentiert die Ergebnisse der Statistik der 2005 in der Schweiz durchgeführten straflosen Schwangerschaftsabbrüche. Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert diese Statistik zum zweiten Mal. Seit Inkrafttreten der Fristenregelung im Oktober 2002 müssen die den Abbruch durchführenden Ärztinnen und Ärzte zu statistischen Zwecken alle Eingriffe ihrem Kantonsarzt melden. Vorher galten kantonal unterschiedliche Regelungen.

Bisherige Datenquellen und Organisation der künftigen Erhebungen

Die Daten zu den Abbrüchen in den Jahren 2004 und 2005 wurden direkt von den kantonalen Gesundheitsdirektionen erhoben. Die Daten bis 2003 beruhen grösstenteils auf Meldungen der Kantone, zum kleineren Teil auf Schätzungen der ehemaligen Schweizerischen Vereinigung für die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches (SVSS).

Nicht alle Kantone erheben dieselben Informationen; einige der im Bericht präsentierten Tabellen sind daher unvollständig. Das BFS arbeitet gegenwärtig zusammen mit den Kantonen daran, die Datenerhebung zu harmonisieren. Zu diesem Zweck hat es zwei Standardformulare entworfen: ein kurzes Formular mit den Mindestangaben und eine lange Version mit detaillierten soziodemografischen Daten. Diese Formulare werden von einigen Kantonen seit dem 1. Januar 2006 verwendet. Jene Kantone, die eigene Formulare benutzen, müssen diese bis zum 1. Januar 2008 so vereinheitlichen, dass die übermittelten Mindestangaben jenen des kurzen BFS-Formulars entsprechen. Das BFS hat darüber hinaus ein Meldesystem via Internet eingerichtet. Das System wurde am 1. Januar 2006 in Betrieb genommen. Einige Kantone erheben und publizieren umfassendere Daten als in diesem Bericht präsentiert.

I Introduction

Cette publication présente les statistiques des interruptions de grossesse non punissables effectuées en Suisse en 2005. C'est la deuxième année consécutive que de telles statistiques sont publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Depuis l'entrée en vigueur du régime du délai en octobre 2002, tous les médecins pratiquant des interruptions de grossesse en Suisse ont l'obligation de déclarer chaque intervention au médecin cantonal; ceci à des fins statistiques. Auparavant, la réglementation variait d'un canton à l'autre.

Source des données et organisation des futurs relevés

Les données 2004–2005 ont été collectées directement auprès des départements cantonaux de la santé. Jusqu'en 2003, les données proviennent, pour une large part, des cantons et, pour une faible part, d'estimations de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA).

Les cantons ne récoltent pas tous les mêmes informations; certains tableaux présentés dans ce rapport sont donc incomplets. L'OFS travaille actuellement avec les cantons pour harmoniser les données récoltées. Il a créé deux formulaires standardisés: un formulaire court avec des données minimales et un formulaire long avec des données sociodémographiques plus détaillées. Ces formulaires sont utilisés par certains cantons depuis le 1^{er} janvier 2006. D'ici au 1^{er} janvier 2008, les cantons utilisant leur propre formulaire doivent les uniformiser de manière à ce qu'ils livrent au minimum les informations correspondant aux données du formulaire court de l'OFS. L'OFS a également mis en place un système de déclaration par internet. Ce système est disponible depuis le 1^{er} janvier 2006. Certains cantons recueillent et publient des données plus exhaustives que celles présentées dans ce rapport.

Anmerkung zur Methode

Zur Berechnung der *Rate der Schwangerschaftsabbrüche* wird gemäss internationalem Standard die Zahl der in einer bestimmten Region wohnhaften Frauen in gebärfähigem Alter (15–44 Jahre), bei denen ein Abbruch vorgenommen wurde, mit der Zahl der in dieser Region wohnhaften Frauen in gebärfähigem Alter in Bezug gesetzt.

Anhand der von den Kantonen erhobenen und übermittelten Daten kann diese Rate nicht errechnet werden. Dafür bräuchte es neben den Angaben zum Alter für jeden einzelnen Fall auch Informationen zum Wohnkanton. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle ungefähre Raten publiziert, bei denen Folgendes berücksichtigt wurde:

- entweder die Gesamtzahl der Fälle (*Bruttoreate*)
- oder die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, die im Wohnkanton vorgenommen wurden (*Rate im Wohnkanton*).

In der ersten Variante werden alle Schwangerschaftsabbrüche ausgewiesen, einschliesslich der Abbrüche bei Frauen, die nicht in der untersuchten Region wohnhaft sind. Die Effekte des «Medizintourismus» können also nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden die Raten der Grenzkantone und insbesondere der Kantone mit Universitätsspital wahrscheinlich überschätzt. Andererseits stellt die für den Wohnkanton ermittelte Rate eine Unterschätzung dar, da die ausserkantonale vorgenommenen Abbrüche nicht den entsprechenden Wohnkantonen zugeordnet werden können. Bei beiden Raten werden alle Schwangerschaftsabbrüche unabhängig vom Alter (also nicht nur jene, die bei Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren vorgenommen werden) gezählt. Im Ausland vorgenommene Abbrüche fehlen hingegen.

Remarque méthodologique

Selon les normes internationales, les *taux d'interruptions de grossesse* se calculent en rapportant le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées chez les résidentes d'une région en âge de procréer (15–44 ans) au nombre de femmes en âge de procréer résidant dans cette même région.

Les données récoltées et fournies par les cantons ne permettent pas de calculer de tels taux. Pour cela, il faudrait en plus des données sur l'âge, des données sur le canton de domicile de chaque cas. Nous présenterons donc des taux approximatifs en prenant en compte:

- soit le nombre total des cas (*taux bruts*)
- soit le nombre d'interruptions de grossesse effectuées par des femmes dans leur canton de domicile (*taux dans le canton de domicile*).

Dans le premier cas, toutes les interruptions de grossesse sont dénombrées, y compris les interruptions pratiquées chez des femmes ne résidant pas dans la zone étudiée. Le «tourisme médical» est donc aussi pris en compte. Les taux des cantons frontaliers et des cantons avec des hôpitaux universitaires, notamment, y sont donc probablement surestimés. A l'inverse, le taux dans le canton de domicile sousestime le taux réel vu que les interruptions effectuées hors canton ne sont pas prises en compte. Dans les deux cas, les interruptions de grossesse quel que soit l'âge des femmes concernées (et pas uniquement celles effectuées chez des femmes de 15 à 44 ans) sont comptabilisées. Les interruptions effectuées hors de Suisse ne le sont, en revanche, pas.

II Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2005 und jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2005 wurden in der Schweiz 10'774 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Gemäss Tabelle T1 scheint die Zahl der jährlichen Abbrüche seit 2003 stabil zu sein. Gegenüber 2001 hat sie jedoch abgenommen.

Im Jahr 2005 wurden in der Schweiz 7 Schwangerschaftsabbrüche auf 1000 Frauen in gebärfähigem Alter registriert (vgl. T2: Bruttorate). Diese Zahl überschätzt die Rate der Abbrüche bei der Schweizer Wohnbevölkerung, da auch Abbrüche eingeschlossen sind, die an im Ausland wohnhaften Frauen oder an Frauen ausserhalb der Alterskategorie der gebärfähigen Frauen (15–44 Jahre) vorgenommen wurden (Zu der Zahl der in der Schweiz wohnhaften Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch im Ausland vornehmen lassen, gibt es keine Angaben; diese ist wahrscheinlich nicht sehr hoch und kann daher auch die Faktoren der Überschätzung nicht aufwiegen). Gegenüber den Nachbarländern ist die Abbruchrate in der Schweiz tief. In Belgien lag die Abbruchrate pro 1000 Frauen in gebärfähigem Alter im Jahr 2003 bei 7,9; in den Niederlanden im Jahr 2003 bei 8,7; in England/Wales im Jahr 2005 bei 17,8; in Spanien im Jahr 2005 bei 9,6. Länder, die die Altersspanne 15 bis 49 Jahre anwenden, weisen folgende Raten auf: Frankreich 14,6 im Jahr 2004; Italien 9,2 im Jahr 2002 und Norwegen 12,9 im Jahr 2005 (die Zahlen stammen aus den nationalen Statistiken).

In der Schweiz kommen auf 1000 Geburten durchschnittlich 139 bzw. 148 Schwangerschaftsabbrüche, je nachdem ob man die Bruttorate oder die Rate nach Wohnsitz berücksichtigt (vgl. T3). Die Bruttorate variiert je nach Kanton zwischen 33 und 311 Abbrüchen auf 1000 Geburten. Im internationalen Vergleich gehört die Schweiz zu den Ländern mit den tiefsten Raten: 2003 lag die Bruttorate in Belgien bei 139, in den Niederlanden bei 144, in Deutschland und in Spanien jeweils bei 181, in Finnland bei 189, in Frankreich bei 274 und in der aus den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO bestehenden europäischen Region bei 457 (vgl. <http://www.euro.who.int/HFADB>; Stand vom 12.01.2007).

II Interruptions de grossesse en 2005 et évolution récente

En 2005, 10'774 interruptions de grossesse ont été déclarées en Suisse. Selon le tableau T1, le nombre annuel d'interruptions de grossesse semble stable depuis 2003. Il a par contre diminué par rapport à 2001.

Ainsi, en 2005, environ 7 interruptions de grossesse ont été effectuées en Suisse pour 1000 femmes en âge de procréer (cf. T2: taux brut). Ce chiffre surestime le taux d'interruption de grossesse au sein de la population résidente suisse, étant donné qu'il inclut, dans le numérateur, les interruptions effectuées chez des femmes vivant à l'étranger ou chez des femmes qui n'entrent pas dans la catégorie des femmes en âge de procréer (15–44 ans) (Le nombre de femmes résidant en Suisse et effectuant une interruption de grossesse à l'étranger n'est pas connu ; il est cependant peu probable qu'il soit élevé et donc qu'il contrebalance les facteurs à l'origine de cette surestimation). Le taux d'interruption de grossesse en Suisse est bas par rapport aux pays voisins. En effet, ce taux pour mille femmes en âge de procréer était de 7,9 en Belgique en 2003, de 8,7 au Pays-Bas en 2003, de 17,8 en Angleterre/Pays de Galles en 2005, et de 9,6 en Espagne en 2005. Les pays considérant la tranche d'âge des 15-49 ans obtiennent les taux suivants: France 14,6 en 2004, Italie 9,2 en 2002, et Norvège 12,9 en 2005 (chiffres provenant des statistiques nationales).

En Suisse, selon que l'on considère le taux brut ou le taux dans le lieu de domicile, on compte en moyenne entre 139 et 148 interruptions de grossesse pour mille naissances (cf. T3). Selon les cantons, le taux brut varie entre 33 et 311 interruptions de grossesse pour 1000 naissances. En comparaison internationale, la Suisse fait partie des pays avec le plus faible taux: en effet, en 2003, ce même taux était de 139 en Belgique, 144 au Pays Bas, 181 en Allemagne, 181 en Espagne, 189 en Finlande, 274 en France, et de 457 dans les Etats membres de la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé (cf. <http://www.euro.who.int/HFADB>; site visité le 12.01.2007).

III Schwangerschaftsabbrüche nach Altersklassen

Die Tabelle T4 zeigt, dass 1% der Frauen, die 2005 einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben, unter 16 Jahre alt waren. Dieser Anteil ist in allen Kantonen, die diese Information erheben, relativ tief.

In 11% der Fälle waren die betroffenen Frauen zwischen 15 und 19 Jahre alt (vgl. T5). Eine auf diesem Anteil basierende Schätzung für das Jahr 2005 führt zu total 1200 Schwangerschaftsabbrüchen in dieser Alterskategorie. Dies entspricht einer Rate von 5,6 Abbrüchen auf 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Da die im Ausland wohnhaften Frauen berücksichtigt werden, überschätzt diese Zahl die tatsächliche Rate bei den Schweizer Teenagern. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Zahl der Teenagergeburten in der Schweiz im internationalen Vergleich sehr tief ist (4 Geburten auf 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren) und ständig weiter abnimmt (Wanner P., Teenagergeburten in der Schweiz, 1969–2004, Neuchâtel: BFS 2005).

III Interruptions de grossesse par groupe d'âge

Le tableau T4 montre que 1% des femmes ayant subi une interruption de grossesse en 2005 étaient âgées de moins de 16 ans. Cette proportion est relativement basse dans tous les cantons où cette information est disponible.

Dans 11% des cas, les femmes concernées étaient âgées de 15 à 19 ans (cf. T5). On peut estimer, sur la base de ce pourcentage, qu'il y a eu environ 1200 interruptions de grossesse dans ce groupe d'âge en Suisse en 2005. Cela correspond à un taux de 5,6 interruptions de grossesse pour mille femmes de 15 à 19 ans. Les femmes domiciliées à l'étranger étant incluses, ce chiffre surestime le taux réel au sein de la population des adolescentes en Suisse. Une étude récente montre que, en comparaison internationale, le nombre de naissances chez les adolescentes est très bas en Suisse – avec quatre naissances pour mille femmes de 15 à 19 ans – et qu'il est en constante diminution (Wanner P., Naissances adolescentes en Suisse, 1969–2004. Neuchâtel: OFS 2005).

IV Schwangerschafts- woche und Abbruchmethode

Rund 95% der Schwangerschaftsabbrüche wurden innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen durchgeführt (vgl. T6). Die 2002 eingeführte Fristenregelung erlaubt den straffreien Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft. Danach ist ein Abbruch nur zulässig, um die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung abzuwenden, oder wenn eine schwere seelische Notlage bei der Schwangeren vorliegt.

Es werden zwei Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches angewendet: der medikamentöse Abbruch (Verabreichung von Mifepriston und/oder Prostaglandine) oder der chirurgische Abbruch (Absaugung, Kürettage). Es kann vorkommen, dass die medikamentöse Methode fehlschlägt und der Arzt oder die Ärztin darauf die chirurgische Methode anwenden muss. Rund die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2005 wurde ausschliesslich chirurgisch durchgeführt (vgl. T7). Bei den anderen fünfzig Prozent wurde die medikamentöse Methode eingesetzt (ggf. gefolgt von einem Eingriff). Der Anteil der chirurgischen Abbrüche variiert je nach Kanton zwischen 33% und 100%. Die Ärzte der Kantone der Genferseeregion scheinen häufiger die chirurgische Methode anzuwenden.

IV Délai et méthode employée

Quelque 95% des interruptions de grossesse ont été pratiquées au cours des 12 premières semaines de la grossesse (cf. T6). Le régime du délai, en vigueur depuis 2002, autorise l'interruption de grossesse au cours des douze premières semaines de la grossesse. Au-delà, l'interruption n'est autorisée que pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou si un état de détresse profonde de la femme enceinte l'exige.

Deux types d'interventions sont utilisées pour les interruptions de grossesse: l'interruption médicamenteuse (ingestion de mifépristone et/ou prostaglandine) ou l'interruption chirurgicale (aspiration, curetage). Il arrive parfois que la méthode médicamenteuse échoue et que le médecin doive recourir à la méthode chirurgicale dans un deuxième temps. Environ la moitié des interruptions de grossesse en 2005 ont été pratiquées par voie chirurgicale seulement (cf. T7). Dans cinquante autres pour cent des cas, la méthode médicamenteuse (suivie ou non d'une intervention chirurgicale) a été utilisée. La part des interventions chirurgicales varie selon les cantons entre 33% et 100% des cas. Les médecins de la région lémanique semblent recourir plus souvent à la méthode chirurgicale.

V Wohnsitz und Nationalität

Rund 5% der Frauen, die in der Schweiz einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben, hatten ihren Wohnsitz im Ausland (vgl. T8). Diese Zahl variiert je nach Kanton zwischen 1% und 19%; die Kantone Genf, Zürich und Tessin wiesen die höchsten Anteile an Frauen mit ausländischem Wohnsitz auf. Wie viele in der Schweiz wohnhafte Frauen im Gegenzug einen Schwangerschaftsabbruch im Ausland vornehmen liessen, ist unbekannt.

Tabelle T9 zeigt, dass nicht alle Frauen den Abbruch im eigenen Wohnkanton durchführen lassen. Im Durchschnitt stammen 88% der Frauen aus dem Kanton, in welchem der Abbruch vorgenommen wurde. Dieser Anteil variiert je nach Kanton zwischen 69% und 95%.

Bei der Hälfte der Abbrüche, bei denen die Nationalität der Schwangeren bekannt ist, sind die Frauen Ausländerinnen. Dies ist ein grosser Anteil, wenn man bedenkt, dass ihr Anteil an der Wohnbevölkerung lediglich 26% ausmacht (Ausländeranteil der Frauen von 15 bis 44 Jahren im Jahr 2005).

V Domicile et nationalité

Environ 5% des femmes qui ont procédé à une interruption de grossesse en Suisse étaient domiciliées dans un pays étranger (cf. T8). Ce chiffre varie entre 1% et 19% selon les cantons; les cantons de Genève, de Zurich et du Tessin ayant le plus haut pourcentage de femmes ne résidant pas en Suisse. On ne connaît pas le nombre de femmes domiciliées en Suisse ayant subi une interruption de grossesse à l'étranger.

Comme le montre le tableau T9, les femmes ne procèdent pas toutes à l'interruption de grossesse dans leur canton de domicile. En moyenne, 88% des femmes sont domiciliées dans le canton où l'interruption de grossesse a été pratiquée. Cette proportion varie selon les cantons entre 69% et 95%.

La moitié des femmes ayant subi une interruption de grossesse – parmi celles dont la nationalité est connue – sont de nationalité étrangère (cf. T10). Cette proportion est élevée au regard de leur proportion dans la population résidante, qui n'était que de 26% en 2005 (part des étrangères parmi les femmes de 15 à 44 ans).

VI Tabellen

Methodische Anmerkungen zu den Tabellen

1. In den folgenden Tabellen werden Statistiken nach Kanton und nach Region präsentiert. Regionale Statistiken werden nur dann dargestellt, wenn Angaben zu mindestens 75% der Schwangerschaftsabbrüche verfügbar sind. Aufgrund der beschränkten Angaben in einigen Regionen, können die Ergebnisse nicht für die gesamte Region verallgemeinert werden.
2. Wurde das vollendete Lebensjahr nicht erhoben, dient das Geburtsjahr der Frau als Grundlage.
3. Die dargestellten Raten basieren entweder auf der Gesamtzahl der Abbrüche (Bruttorate) oder auf der Zahl der im Wohnkanton vorgenommenen Abbrüche (Rate im Wohnkanton). Aufgrund der von den Kantonen erhobenen und übermittelten Daten kann diese Rate nicht gemäss internationalem Standard berechnet werden (siehe Einleitung).
4. Fehlende Daten werden mit drei Punkten (...) dargestellt. Die Daten in Klammern haben lediglich Informationscharakter; sie wurden bei der Berechnung des Totals oder der Anteile nicht berücksichtigt.

VI Tableaux

Remarques méthodologiques sur les tableaux

1. Dans les tableaux qui suivent, des statistiques par canton et par région sont présentées. En ce qui concerne les statistiques régionales, nous avons décidé de ne les présenter que lorsque des données étaient disponibles pour au moins 75% des interruptions de grossesse. Le nombre limité de données dans certaines régions ne permet pas de généraliser les résultats à la région.
2. Lorsque l'âge révolu n'a pas été relevé, nous nous sommes basés sur l'année de naissance de la femme.
3. Les taux présentés se basent soit sur le nombre total des cas (taux brut), soit sur le nombre des interruptions effectuées dans le canton de domicile (taux dans le canton de domicile). Les données récoltées et fournies par les cantons ne permettent pas de calculer des taux selon les normes internationales (voir Introduction).
4. Les données manquantes sont signalées par trois petits points (...). Les données entre parenthèse sont données à titre informatif; ils ne sont pas inclus dans les calculs des totaux ou des pourcentages.

T1 Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz 2001–2005, nach Kanton und Grossregion Interruptions de grossesse en Suisse, 2001–2005, par canton et par grande région

	2001	2002	2003	2004	2005	
Schweiz	12 418	11 836	10 805	10 937	10 774	Suisse
Genferseeregion	3 444	3 280	2 859	2 862	2 931	Région lémanique
Genf	1 490	1 485	1 413	1 499	1 494	Genève
Wallis	229	240	178	174	231	Valais
Waadt	1 725	1 555	1 268	1 189	1 206	Vaud
Espace Mittelland	2 305	2 264	1 944	2 070	1 941	Espace Mittelland
Bern	1 176	1 194	1 030	1 079	989	Berne
Freiburg	272	267	256	275	299	Fribourg
Jura	106	107	89	100	92	Jura
Neuchâtel	411	396	331	368	328	Neuchâtel
Solothurn	340	300	238	248	233	Soleure
Nordwestschweiz	1 413	1 328	1 249	1 389	1 392	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	700	650	600	599	571	Argovie
Basel-Landschaft	336	307	316	329	349	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	377	371	333	461	472	Bâle-Ville
Zürich	3 000	2 800	2 525	2 387	2 304	Zurich
Ostschweiz	1 064	988	973	1 022	1 003	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	23	29	33	44	40	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	0	2	5	6	5	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	45	36	26	50	37	Glaris
Graubünden	207	206	187	192	204	Grisons
St. Gallen	467	430	449	451	438	Saint-Gall
Schaffhausen	106	85	84	83	90	Schaffhouse
Thurgau	216	200	189	196	189	Thurgovie
Zentralschweiz	526	558	650	605	613	Suisse centrale
Luzern	366	395	420	377	393	Lucerne
Nidwalden	0	0	10	6	13	Nidwald
Obwalden	0	4	33	23	27	Obwald
Schwyz	41	49	65	86	70	Schwyz
Uri	15	21	24	24	20	Uri
Zug	104	89	98	89	90	Zoug
Ticino	666	618	605	602	590	Tessin

Quellen:

Die Daten 2004 und 2005 kommen direkt von den betreffenden Kantonen.

Die Daten bis 2003 beruhen grösstenteils auf Meldungen der Kantone, zum kleineren Teil auf Schätzungen der ehemaligen Schweizerischen Vereinigung für die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches (SVSS).

Sources:

Les chiffres de 2004 et 2005 proviennent directement des cantons.

Jusqu'en 2003, les données proviennent, pour une large part, des cantons et, pour une faible part, d'estimations de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA).

T2 Raten der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz 2005, nach Kanton und Grossregion Taux d'interruptions de grossesse en Suisse en 2005, par canton et par grande région

	Abbrüche pro 1000 Frauen im Alter von 15–44 Jahren (Rohe Raten) Interruptions pour 1000 femmes de 15 à 44 ans (taux brut)	Abbrüche im Wohnkanton pro 1000 Frauen im Alter von 15–44 Jahren (Raten im Wohnkanton) Interruptions dans le canton de domicile pour 1000 femmes de 15–44 ans (taux dans le canton de domicile)	
Schweiz	7,0	6,6 ¹	Suisse
Genferseeregion	10,1	9,2	Région lémanique
Genève	15,9	14,7	Genève
Valais	3,8	3,4	Valais
Vaud	8,8	8,1	Vaud
Espace Mittelland	5,6	5,2	Espace Mittelland
Bern	5,2	4,8	Berne
Fribourg	5,5	5,2	Fribourg
Jura	6,8	6,0	Jura
Neuchâtel	9,6	8,9	Neuchâtel
Solothurn	4,6	4,1	Soleure
Nordwestschweiz	6,6	5,3	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	4,8	4,3	Argovie
Basel-Landschaft	6,6	4,6	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	12,2	9,5	Bâle-Ville
Zürich	8,6	7,3	Zurich
Ostschweiz	4,6	...	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	3,9	...	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	1,7	...	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	4,8	4,3	Glaris
Graubünden	5,3	...	Grisons
St. Gallen	4,5	...	Saint-Gall
Schaffhausen	6,2	5,3	Schaffhouse
Thurgau	3,9	...	Thurgovie
Zentralschweiz	4,1	3,7	Suisse centrale
Luzern	5,2	4,9	Lucerne
Nidwalden	1,6	...	Nidwald
Obwalden	3,8	3,1	Obwald
Schwyz	2,4	...	Schwyz
Uri	2,9	2,4	Uri
Zug	3,9	3,1	Zoug
Ticino	9,1	7,3	Tessin

¹ Taux extrapolé des interruptions de grossesse pratiquées par des résidentes suisses pour 1000 femmes de 15–44 ans
Extrapolierte Rate der Schwangerschaftsabbrüche an in der Schweiz wohnhaften Frauen pro 1000 Frauen im Alter von 15–44 Jahren

T3 Schwangerschaftsabbrüche 2005 pro tausend Geburten nach Kanton und Grossregion Interruptions de grossesse pour mille naissances en 2005, par canton et par grande région

	Geburten Naissances	Abbrüche pro 1000 Geburten (Rohe Raten pro 1000 Geburten) Interruptions pour 1000 naissances taux brut pour 1000 naissance)	Abbrüche im Wohnkanton pro 1000 Geburten Interruptions dans le canton de domicile pour 1000 naissances	
Schweiz	72 903	147,8	139,4 ¹	Suisse
Genferseeregion	14 819	197,8	181,5	Région lémanique
Genève	4 806	310,9	286,5	Genève
Valais	2 814	82,1	72,5	Valais
Vaud	7 199	167,5	154,0	Vaud
Espace Mittelland	16 053	120,9	112,2	Espace Mittelland
Bern	8 595	115,1	107,5	Berne
Fribourg	2 745	108,9	103,8	Fribourg
Jura	682	134,9	118,8	Jura
Neuchâtel	1 819	180,3	167,1	Neuchâtel
Solothurn	2 212	105,3	93,6	Soleure
Nordwestschweiz	9 392	148,2	119,7	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	5 495	103,9	94,3	Argovie
Basel-Landschaft	2 268	153,9	106,3	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	1 629	289,7	224,1	Bâle-Ville
Zürich	13 296	173,3	146,4	Zurich
Ostschweiz	9 520	105,4	...	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	448	89,3	...	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	150	33,3	...	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	329	112,5	100,3	Glaris
Graubünden	1 528	133,5	...	Grisons
St. Gallen	4 330	101,2	...	Saint-Gall
Schaffhausen	626	143,8	124,6	Schaffhouse
Thurgau	2 109	89,6	...	Thurgovie
Zentralschweiz	7 039	87,1	92,7	Suisse centrale
Luzern	3 436	114,4	108,0	Lucerne
Nidwalden	379	34,3	...	Nidwald
Obwalden	304	88,8	72,4	Obwald
Schwyz	1 462	47,9	...	Schwyz
Uri	315	63,5	54,0	Uri
Zug	1 143	78,7	63,0	Zoug
Ticino	2784	211,9	171,0	Tessin

¹ Taux extrapolé des interruptions de grossesse pratiquées par des résidentes suisses pour 1000 naissances
Extrapolierte Rate der Schwangerschaftsabbrüche an in der Schweiz wohnhaften Frauen pro 1000 Geburten

T4 Schwangerschaftsabbrüche unter 16 Jahren, 2005 Interruptions de grossesse avant l'âge de 16 ans, 2005

	Total	Alter der Frau / Age de la femme						
		< 16		≥ 16		Nicht bekannt / Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz¹	8 577	84	1,0	8 466	98,7	27	0,3	Suisse¹
Genferseeregion	2 931	24	0,8	2 893	98,7	14	0,5	Région lémanique
Genève	1 494	8	0,5	1 478	98,9	8	0,5	Genève
Valais	231	1	0,4	228	98,7	2	0,9	Valais
Vaud	1 206	15	1,2	1 187	98,4	4	0,3	Vaud
Espace Mittelland	719	Espace Mittelland
Bern	(989)	Berne
Fribourg	299	2	0,7	297	99,3	0	0,0	Fribourg
Jura	92	1	1,1	91	98,9	0	0,0	Jura
Neuchâtel	328	0	0,0	328	100,0	0	0,0	Neuchâtel
Solothurn	(233)	Soleure
Nordwestschweiz ²	1 043	7	0,7	1 023	98,1	13	1,2	Suisse du Nord-Ouest ²
Aargau	571	3	0,5	567	99,3	1	0,2	Argovie
Basel-Landschaft	(349)	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	472	4	0,8	456	96,6	12	2,5	Bâle-Ville
Zürich	2 304	37	1,6	2 267	98,4	0	0,0	Zurich
Ostschweiz ³	963	11	1,1	952	98,9	0	0,0	Suisse orientale ³
Appenzell A. Rh.	(40)	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	5	0	0,0	5	100,0	0	0,0	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	1	2,7	36	97,3	0	0,0	Glaris
Graubünden	204	2	1,0	202	99,0	0	0,0	Grisons
St. Gallen	438	5	1,1	433	98,9	0	0,0	Saint-Gall
Schaffhausen	90	1	1,1	89	98,9	0	0,0	Schaffhouse
Thurgau	189	2	1,1	187	98,9	0	0,0	Thurgovie
Zentralschweiz	27	Suisse centrale
Luzern	(393)	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	0	0,0	27	100,0	0	0,0	Obwald
Schwyz	(70)	Schwyz
Uri	(20)	Uri
Zug	(90)	Zoug
Ticino	590	2	0,3	588	99,7	0	0,0	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 8577 Fälle, für die Daten vorliegen (80% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 8577 cas pour lesquels des données existent (correspond à 80% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 1043 Fälle, für die Daten vorliegen (75% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1043 cas pour lesquels des données existent (correspond à 75% des interruptions de grossesse)

³ Berechnungen auf der Basis der 963 Fälle, für die Daten vorliegen (96% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 963 cas pour lesquels des données existent (correspond à 96% des interruptions de grossesse)

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender Datenlage für den Espace Mittelland und die Zentralschweiz nicht berechnet.
Les totaux et les pourcentages n'ont pas été calculés pour les régions de l'Espace Mittelland et de Suisse centrale compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles.

T5 Schwangerschaftsabbrüche nach Altersklassen 15–44 und 15–19 Jahre, 2005

Interruptions de grossesse dans les classes d'âge 15–44 ans et 15–19 ans, 2005

	Total	Frauen 15–44 Jahre Femmes de 15–44 ans		Rate/1000 Frauen 15–44 Jahre ⁴	Frauen 15–19 Jahre Femmes de 15–19 ans		Rate/1000 Frauen 15–19 Jahre ⁴	
		n	%	Taux pour 1000 femmes de 15–44 ans ⁴	n	%	Taux pour 1000 femmes de 15–19 ans ⁴	
Schweiz¹	9 341	9 008	96,4	6,7	1 030	11,0	5,6	Suisse¹
Genferseeregion	2 931	2 892	98,7	9,9	356	12,1	9,1	Région lémanique
Genève	1 494	1 472	98,5	15,7	170	11,4	15,1	Genève
Valais	2 31	227	98,3	3,7	21	9,1	2,4	Valais
Vaud	1 206	1 193	98,9	8,7	165	13,7	8,8	Vaud
Espace Mittelland	1 941	1 914	98,6	5,6	217	11,2	4,4	Espace Mittelland
Bern	989	971	98,2	5,1	115	11,6	4,3	Berne
Fribourg	299	295	98,7	5,4	30	10,0	3,6	Fribourg
Jura	92	92	100,0	6,8	14	15,2	6,5	Jura
Neuchâtel	328	324	98,8	9,5	33	10,1	6,4	Neuchâtel
Solothurn	233	232	99,6	4,6	25	10,7	3,3	Soleure
Nordwestschweiz ²	1 043	1 017	97,5	6,4	108	10,4	5,0	Suisse du Nord-Ouest ²
Aargau	571	563	98,6	4,7	63	11,0	3,7	Argovie
Basel-Landschaft	(349)	Bâle-Campagne
Basel-Stadt ³	472	454	96,2	11,8	45	9,5	10,4	Bâle-Ville ³
Zürich	2 304	2 072	89,9	7,7	213	9,2	6,6	Zurich
Ostschweiz	435	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	(40)	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	5	5	100,0	1,7	2	40,0	3,9	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	37	100,0	4,8	5	13,5	4,0	Glaris
Graubünden	204	203	99,5	5,2	18	8,8	3,1	Grisons
St. Gallen	(438)	Saint-Gall
Schaffhausen	(90)	Schaffhouse
Thurgau	189	188	99,5	3,8	30	15,9	4,0	Thurgovie
Zentralschweiz	97	Suisse centrale
Luzern	(393)	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	27	100,0	3,8	5	18,5	4,3	Obwald
Schwyz	70	70	100,0	2,4	8	11,4	2,0	Schwyz
Uri	(20)	Uri
Zug	(90)	Zoug
Ticino	590	583	98,8	8,9	68	11,5	8,9	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 9341 Fälle, für die Daten vorliegen (87% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 9341 cas pour lesquels des données existent (correspond à 87% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 1043 Fälle, für die Daten vorliegen (75% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1043 cas pour lesquels des données existent (correspond à 75% des interruptions de grossesse)

³ 16–44 Jahre, 16–19 Jahre / 16–44 ans, 16–19 ans

⁴ Bei den Ratenberechnungen sind im Ausland wohnhafte Frauen eingeschlossen. / Les femmes domiciliées à l'étranger sont incluses dans le calcul des taux.

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender Datenlage für die Ostschweiz und die Zentralschweiz nicht berechnet.
Les totaux et les pourcentages n'ont pas été calculés pour les régions de Suisse orientale et de Suisse centrale compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles.

T 6 Schwangerschaftsabbrüche nach Schwangerschaftswoche, 2005

Interruptions de grossesse selon le nombre de semaines, 2005

	Total	Schwangerschaftswoche / Nombre de semaines de grossesse						
		≤ 12 Wo / sem.		> 12 Wo / sem.		Nicht bekannt / Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz¹	8 714	8 138	93,4	404	4,6	172	2,0	Suisse¹
Genferseeregion	2 931	2 693	91,9	140	4,8	98	3,3	Région lémanique
Genève	1 494	1 367	91,5	75	5,0	52	3,5	Genève
Valais	231	206	89,2	1	0,4	24	10,4	Valais
Vaud	1 206	1 120	92,9	64	5,3	22	1,8	Vaud
Espace Mittelland ²	1 613	1 548	96,0	60	3,7	5	0,3	Espace Mittelland ²
Bern	989	953	96,4	36	3,6	0	0,0	Berne
Fribourg	299	286	95,7	13	4,3	0	0,0	Fribourg
Jura	92	87	94,6	5	5,4	0	0,0	Jura
Neuchâtel	(328)	Neuchâtel
Solothurn	233	222	95,3	6	2,6	5	2,1	Soleure
Nordwestschweiz	920	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	571	534	93,5	15	2,6	22	3,9	Argovie
Basel-Landschaft	349	340	97,4	5	1,4	4	1,1	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	(472)	Bâle-Ville
Zürich	2 304	2 157	93,6	147	6,4	0	0,0	Zurich
Ostschweiz ³	759	691	91,0	27	3,6	41	5,4	Suisse orientale ³
Appenzell A. Rh.	(40)	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	5	5	100,0	0	0,0	0	0,0	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	37	100,0	0	0,0	0	0,0	Glaris
Graubünden	(204)	Grisons
St. Gallen	438	386	88,1	12	2,7	40	9,1	Saint-Gall
Schaffhausen	90	85	94,4	5	5,6	0	0,0	Schaffhouse
Thurgau	189	178	94,2	10	5,3	1	0,5	Thurgovie
Zentralschweiz	187	Suisse centrale
Luzern	(393)	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	26	96,3	1	3,7	0	0,0	Obwald
Schwyz	70	63	90,0	5	7,1	2	2,9	Schwyz
Uri	(20)	Uri
Zug	90	86	95,6	4	4,4	0	0,0	Zoug
Ticino	(590)	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 8714 Fälle, für die Daten vorliegen (81% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 8714 cas pour lesquels des données existent (correspond à 81% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 1613 Fälle, für die Daten vorliegen (83% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1613 cas pour lesquels des données existent (correspond à 83% des interruptions de grossesse)

³ Berechnungen auf der Basis der 759 Fälle, für die Daten vorliegen (76% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 759 cas pour lesquels des données existent (correspond à 76% des interruptions de grossesse)

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender oder nichtvorhandener Datenlage für die Nordwestschweiz, die Zentralschweiz und das Tessin nicht berechnet.

Les totaux et les pourcentages n'ont pas été calculés pour les régions du Nord Ouest, de la Suisse centrale et du Tessin compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles ou de leur inexistence.

T7 Schwangerschaftsabbrüche nach Abbruchmethode, 2005

Interruptions de grossesse selon la méthode employée, 2005

	Total	Abbruchmethode / Méthode						
		Medikamentös ¹ médicamenteuse ¹		Chirurgisch chirurgicale		Nicht bekannt Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz²	10 761	5 321	49,4	5 303	49,3	137	1,3	Suisse²
Genferseeregion	2 931	1 079	36,8	1 758	60,0	94	3,2	Région lémanique
Genève	1 494	563	37,7	876	58,6	55	3,7	Genève
Valais	231	136	58,9	77	33,3	18	7,8	Valais
Vaud	1 206	380	31,5	805	66,7	21	1,7	Vaud
Espace Mittelland	1 941	1 030	53,1	910	46,9	1	0,1	Espace Mittelland
Bern	989	488	49,3	501	50,7	0	0,0	Berne
Fribourg	299	157	52,5	142	47,5	0	0,0	Fribourg
Jura	92	67	72,8	25	27,2	0	0,0	Jura
Neuchâtel	328	184	56,1	144	43,9	0	0,0	Neuchâtel
Solothurn	233	134	57,5	98	42,1	1	0,4	Soleure
Nordwestschweiz	1 392	716	51,4	658	47,3	18	1,3	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	571	285	49,9	281	49,2	5	0,9	Argovie
Basel-Landschaft	349	181	51,9	168	48,1	0	0,0	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	472	250	53,0	209	44,3	13	2,8	Bâle-Ville
Zürich	2 304	1 329	57,7	975	42,3	0	0,0	Zurich
Ostschweiz	1 003	519	51,7	461	46,0	23	2,3	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	40	29	72,5	11	27,5	0	0,0	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	5	0	0,0	5	100,0	0	0,0	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	17	45,9	20	54,1	0	0,0	Glaris
Graubünden	204	105	51,5	99	48,5	0	0,0	Grisons
St. Gallen	438	251	57,3	167	38,1	20	4,6	Saint-Gall
Schaffhausen	90	19	21,1	71	78,9	0	0,0	Schaffhouse
Thurgau	189	98	51,9	88	46,6	3	1,6	Thurgovie
Zentralschweiz ³	600	336	56,0	264	44,0	0	0,0	Suisse centrale ³
Luzern	393	220	56,0	173	44,0	0	0,0	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	22	81,5	5	18,5	0	0,0	Obwald
Schwyz	70	28	40,0	42	60,0	0	0,0	Schwyz
Uri	20	18	90,0	2	10,0	0	0,0	Uri
Zug	90	48	53,3	42	46,7	0	0,0	Zoug
Ticino	590	313	53,1	277	46,9	0	0,0	Tessin

¹ Inklusiv Fälle, bei welchen beide Methoden angewendet wurden. / Y compris les cas où les deux méthodes ont été appliquées.

² Berechnungen auf der Basis der 10'761 Fälle, für die Daten vorliegen (99,9% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 10'761 cas pour lesquels des données existent (correspond à 99,9% des interruptions de grossesse)

³ Berechnungen auf der Basis der 600 Fälle, für die Daten vorliegen (98% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 600 cas pour lesquels des données existent (correspond à 98% des interruptions de grossesse)

T8 Schwangerschaftsabbrüche nach Wohnsitzland, 2005

Interruptions de grossesse selon le pays de domicile, 2005

	Total	Wohnsitz / Domicile						
		Schweiz / Suisse		Ausland / Etranger		Nicht bekannt / Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz¹	9 562	9 015	94,3	440	4,6	107	1,1	Suisse¹
Région lémanique	2 931	2 786	95,1	114	3,9	31	1,1	Région lémanique
Genève	1 494	1 413	94,6	70	4,7	11	0,7	Genève
Valais	231	209	90,5	7	3,0	15	6,5	Valais
Vaud	1 206	1 164	96,5	37	3,1	5	0,4	Vaud
Espace Mittelland ²	1 708	1 678	98,2	26	1,5	4	0,2	Espace Mittelland ²
Bern	989	973	98,4	16	1,6	0	0,0	Berne
Fribourg	299	293	98,0	2	0,7	4	1,3	Fribourg
Jura	92	90	97,8	2	2,2	0	0,0	Jura
Neuchâtel	328	322	98,2	6	1,8	0	0,0	Neuchâtel
Solothurn	(233)	Soleure
Nordwestschweiz	1 392	1 307	93,9	14	1,0	71	5,1	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	571	518	90,7	0	0,0	53	9,3	Argovie
Basel-Landschaft	349	342	98,0	7	2,0	0	0,0	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	472	447	94,7	7	1,5	18	3,8	Bâle-Ville
Zürich	2 304	2 139	92,8	165	7,2	0	0,0	Zurich
Ostschweiz	127	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	(40)	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	(5)	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	36	97,3	1	2,7	0	0,0	Glaris
Graubünden	(204)	Grisons
St. Gallen	(438)	Saint-Gall
Schaffhausen	90	86	95,6	4	4,4	0	0,0	Schaffhouse
Thurgau	(189)	Thurgovie
Zentralschweiz ³	510	503	98,6	6	1,2	1	0,2	Suisse centrale ³
Luzern	393	387	98,5	5	1,3	1	0,3	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	27	100,0	0	0,0	0	0,0	Obwald
Schwyz	(70)	Schwyz
Uri	(20)	Uri
Zug	90	89	98,9	1	1,1	0	0,0	Zoug
Ticino	590	480	81,4	110	18,6	0	0,0	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 9562 Fälle, für die Daten vorliegen (89% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 9562 cas pour lesquels des données existent (correspond à 89% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 1708 Fälle, für die Daten vorliegen (88% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1708 cas pour lesquels des données existent (correspond à 88% des interruptions de grossesse)

³ Berechnungen auf der Basis der 510 Fälle, für die Daten vorliegen (83% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 510 cas pour lesquels des données existent (correspond à 83% des interruptions de grossesse)

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender Datenlage für die Ostschweiz nicht berechnet.

Les totaux et pourcentages n'ont pas été calculés pour la Suisse orientale compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles.

T9 Schwangerschaftsabbrüche im Wohnkanton, 2005

Interruptions de grossesse dans le canton de domicile, 2005

	Total	Wohnsitz im Kanton, wo der Abbruch vorgenommen wurde Domicile dans le canton où l'interruption a eu lieu		Wohnsitz ausserhalb dieses Kantons Domicile dans un canton différent		Nicht bekannt Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz¹	9 815	8 630	87,9	1 078	11,0	107	1,1	Suisse¹
Région lémanique	2 931	2 690	91,8	210	7,2	31	1,1	Région lémanique
Genève	1 494	1 377	92,2	106	7,1	11	0,7	Genève
Valais	231	204	88,3	12	5,2	15	6,5	Valais
Vaud	1 206	1 109	92,0	92	7,6	5	0,4	Vaud
Espace Mittelland	1 941	1 801	92,8	136	7,0	4	0,2	Espace Mittelland
Bern	989	924	93,4	65	6,6	0	0,0	Berne
Fribourg	299	285	95,3	10	3,3	4	1,3	Fribourg
Jura	92	81	88,0	11	12,0	0	0,0	Jura
Neuchâtel	328	304	92,7	24	7,3	0	0,0	Neuchâtel
Solothurn	233	207	88,8	26	11,2	0	0,0	Soleure
Nordwestschweiz	1 392	1 124	80,7	197	14,2	71	5,1	Suisse du Nord-Ouest
Aargau	571	518	90,7	0	0,0	53	9,3	Argovie
Basel-Landschaft	349	241	69,1	108	30,9	0	0,0	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	472	365	77,3	89	18,9	18	3,8	Bâle-Ville
Zürich	2 304	1 946	84,5	358	15,5	0	0,0	Zurich
Ostschweiz	127	Suisse orientale
Appenzell A. Rh.	(40)	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	(5)	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	37	33	89,2	4	10,8	0	0,0	Glaris
Graubünden	(204)	Grisons
St. Gallen	(438)	Saint-Gall
Schaffhausen	90	78	86,7	12	13,3	0	0,0	Schaffhouse
Thurgau	(189)	Thurgovie
Zentralschweiz ²	530	482	90,9	47	8,9	1	0,2	Suisse centrale ²
Luzern	393	371	94,4	21	5,3	1	0,3	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	22	81,5	5	18,5	0	0,0	Obwald
Schwyz	(70)	Schwyz
Uri	20	17	85,0	3	15,0	0	0,0	Uri
Zug	90	72	80,0	18	20,0	0	0,0	Zoug
Ticino	590	476	80,7	114	19,3	0	0,0	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 9815 Fälle, für die Daten vorliegen (91% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 9815 cas pour lesquels des données existent (correspond à 91% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 530 Fälle, für die Daten vorliegen (86% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 530 cas pour lesquels des données existent (correspond à 86% des interruptions de grossesse)

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender Datenlage für die Ostschweiz nicht berechnet.

Les totaux et les pourcentages n'ont pas été calculés pour la Suisse orientale compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles.

T 10 Schwangerschaftsabbrüche nach Nationalität, 2005 Interruptions de grossesse selon la nationalité, 2005

	Total	Nationalität / Nationalité						
		Schweiz / Suisse		Ausland / Etranger		Nicht bekannt / Inconnu		
		n	%	n	%	n	%	
Schweiz¹	6 765	3 230	47,8	3 466	51,2	69	1,0	Suisse¹
Genferseeregion	2 931	1 164	39,7	1 720	58,7	47	1,6	Région lémanique
Genève	1 494	594	39,8	874	58,5	26	1,7	Genève
Valais	231	100	43,3	118	51,1	13	5,6	Valais
Vaud	1 206	470	39,0	728	60,4	8	0,7	Vaud
Espace Mittelland ²	1 708	995	58,3	712	41,7	1	0,1	Espace Mittelland ²
Bern	989	559	56,5	430	43,5	0	0,0	Berne
Fribourg	299	162	54,2	137	45,8	0	0,0	Fribourg
Jura	92	65	70,7	27	29,3	0	0,0	Jura
Neuchâtel	328	209	63,7	118	36,0	1	0,3	Neuchâtel
Solothurn	(233)	Soleure
Nordwestschweiz ³	1 043	534	51,2	492	47,2	17	1,6	Suisse du Nord-Ouest ³
Aargau	571	311	54,5	252	44,1	8	1,4	Argovie
Basel-Landschaft	(349)	Bâle-Campagne
Basel-Stadt	472	223	47,2	240	50,8	9	1,9	Bâle-Ville
Zürich	(2304)	Zurich
Ostschweiz ⁴	876	430	49,1	442	50,5	4	0,5	Suisse orientale ⁴
Appenzell A. Rh.	40	29	72,5	11	27,5	0	0,0	Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell I. Rh.	5	3	60,0	2	40,0	0	0,0	Appenzell Rh.-Int.
Glarus	(37)	Glaris
Graubünden	204	89	43,6	112	54,9	3	1,5	Grisons
St. Gallen	438	199	45,4	239	54,6	0	0,0	Saint-Gall
Schaffhausen	(90)	Schaffhouse
Thurgau	189	110	58,2	78	41,3	1	0,5	Thurgovie
Zentralschweiz	207	Suisse centrale
Luzern	(393)	Lucerne
Nidwalden	(13)	Nidwald
Obwalden	27	16	59,3	11	40,7	0	0,0	Obwald
Schwyz	70	29	41,4	41	58,6	0	0,0	Schwyz
Uri	20	16	80,0	4	20,0	0	0,0	Uri
Zug	90	46	51,1	44	48,9	0	0,0	Zoug
Ticino	(590)	Tessin

¹ Berechnungen auf der Basis der 6765 Fälle, für die Daten vorliegen (63% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 6765 cas pour lesquels des données existent (correspond à 63% des interruptions de grossesse)

² Berechnungen auf der Basis der 1708 Fälle, für die Daten vorliegen (88% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1708 cas pour lesquels des données existent (correspond à 88% des interruptions de grossesse)

³ Berechnungen auf der Basis der 1043 Fälle, für die Daten vorliegen (75% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 1043 cas pour lesquels des données existent (correspond à 75% des interruptions de grossesse)

⁴ Berechnungen auf der Basis der 876 Fälle, für die Daten vorliegen (87% der Schwangerschaftsabbrüche)
Calculs basés sur les 876 cas pour lesquels des données existent (correspond à 87% des interruptions de grossesse)

Total und Prozentwerte wurden wegen unzureichender oder nichtvorhandener Datenlage für die Regionen Zürich, Zentralschweiz und Tessin nicht berechnet.
Les totaux et les pourcentages n'ont pas été calculé pour les régions de Zurich, de Suisse centrale et du Tessin compte tenu du nombre insuffisant de données disponibles ou de leur inexistence.

